

## **Использование Тамифлю при лечении педиатрических пациентов – в тех случаях, когда коммерчески приготовленный порошок для приготовления суспензии для приёма внутрь недоступен.**

### *Информационная брошюра*

В случаях, когда коммерчески приготовленный порошок для приготовления суспензии для приёма внутрь недоступен, взрослые, подростки и дети, не способные проглотить капсулу, могут получить необходимые дозы Тамифлю, открыв капсулу и высыпав содержимое капсулы в небольшое количество (максимально 1 чайная ложка) подходящего подслащенного продукта питания (шоколадный сироп (с нормальным содержанием сахара или без содержания сахара), мед (только для детей  $\geq 2$  лет), светло-коричневый сахар или столовый сахар, растворенный в воде, сладкий десерт, сгущенное молоко с сахаром, яблочное пюре или йогурт) для того, чтобы скрыть горький вкус. Смесь необходимо тщательно перемешать и дать пациенту целиком. Следует проглотить смесь сразу же после приготовления. Если пациентам требуются дозы 30–60 мг, то необходимо следовать следующим инструкциям для обеспечения правильного дозирования:

1. Держа одну капсулу 75 мг Тамифлю над маленькой емкостью, аккуратно раскройте капсулу и высыпьте порошок в емкость.
2. Добавьте в порошок 5 мл воды с помощью шприца с метками, показывающими количество набранной жидкости. Тщательно перемешайте в течение 2 минут.
3. Наберите в шприц необходимое количество смеси из чашки согласно нижеприведенной таблице:

<b>Вес</b>	<b>Рекомендованная доза</b>	<b>Количество смеси Тамифлю на один прием</b>
$\leq 15$ кг	30 мг	2 мл
$>15-23$ кг	45 мг	3 мл
$>23-40$ кг	60 мг	4 мл

Нет необходимости в заборе нерастворенного белого порошка, поскольку он является неактивным наполнителем. Нажмите на поршень шприца и введите все его содержимое во вторую емкость. Оставшуюся неиспользованную смесь необходимо выбросить.

4. Во вторую емкость добавьте небольшое количество (не более 1 чайной ложки) подходящего подслащенного продукта питания (чтобы скрыть горький вкус) и хорошо перемешайте.
5. Тщательно перемешайте смесь и дайте все содержимое второй емкости пациенту. Следует проглотить смесь сразу же после приготовления. Если в емкости осталось небольшое количество смеси, то следует ополоснуть емкость небольшим количеством воды и напоить пациента оставшейся смесью.

Если пациентам требуется доза 75 мг, то необходимо следовать следующим инструкциям:

1. Держа одну капсулу 75 мг Тамифлю над маленькой емкостью, аккуратно раскройте капсулу и высыпьте порошок в емкость.
2. Добавьте небольшое количество (не более 1 чайной ложки) подходящего подслащенного продукта питания (чтобы скрыть горький вкус) и хорошо перемешайте.
3. Тщательно перемешайте смесь и дайте все содержимое емкости пациенту. Следует проглотить смесь сразу же после приготовления. Если в емкости осталось небольшое количество смеси, то следует ополоснуть емкость небольшим количеством воды и напоить пациента оставшейся смесью.