

ФИО врача:

.....
.....
.....
.....

Телефон:

.....
.....
.....

Примечания:

.....
.....
.....
.....
.....

Таблица посещений

Пожалуйста используйте данную таблицу, чтобы записывать даты посещений своего врача:

Дата посещения	Вид контрацепции	Результат теста на беременность	Подпись врача
		<input type="checkbox"/> Положительный <input type="checkbox"/> Отрицательный Дата:	
		<input type="checkbox"/> Положительный <input type="checkbox"/> Отрицательный Дата:	
		<input type="checkbox"/> Положительный <input type="checkbox"/> Отрицательный Дата:	
		<input type="checkbox"/> Положительный <input type="checkbox"/> Отрицательный Дата:	
		<input type="checkbox"/> Положительный <input type="checkbox"/> Отрицательный Дата:	
		<input type="checkbox"/> Положительный <input type="checkbox"/> Отрицательный Дата:	
		<input type="checkbox"/> Положительный <input type="checkbox"/> Отрицательный Дата:	
		<input type="checkbox"/> Положительный <input type="checkbox"/> Отрицательный Дата:	



Памятка пациента при приеме Роаккутана®

Специалистам здравоохранения предлагается сообщать о любых подозреваемых нежелательных явлениях в ЗАО «Рош-Москва».
Телефон: +7 (495) 229 29 99,
e-mail: moscow.ds@roche.com
(для сообщения о нежелательных явлениях)
e-mail: moscow.medinfo@roche.com
(для получения медицинской информации по препарату)
Форма обратной связи на сайте: www.roche.ru

Роаккутан®
Изотретиноин

Роаккутан® не следует принимать во время беременности.

Роаккутан® может нанести серьезный вред нерожденному ребенку, если беременная женщина будет его принимать.

Если Вы беременны или подозреваете беременность, немедленно прекратите прием Роаккутана® и обратитесь к врачу.

Внимательно прочтите инструкцию по применению перед началом лечения.

Если у Вас есть какие-либо вопросы или опасения по поводу приема Роаккутана, обсудите их со своим врачом или фармацевтом.

Что следует делать, если у Вас есть вероятность возникновения беременности:

! Вам следует использовать, по крайней мере, один высокоэффективный метод контрацепции (такой как внутриматочное устройство или имплант) или правильно использовать 2 эффективных метода контрацепции, которые направлены на разные пути (такие как оральный контрацептив совместно с презервативом), перед началом терапии, на протяжении всего периода терапии и в течении 1 месяца после окончания терапии.

! Вы не должны забеременеть во время приема Роаккутана® или в первый месяц после окончания терапии.

! Вам необходимо регулярно посещать врача и регулярно выполнять тест на беременность:

- Перед началом терапии Вам нужно пройти тест на беременность, результат которого должен быть отрицательным.
- Чтобы убедиться, что Вы не беременны во время терапии, Вам следует регулярно выполнять тесты на беременность, предпочтительно ежемесячно, а также выполнить заключительный тест на беременность через 1 месяц после окончания терапии.

Напоминание для мужчин и женщин

Данный препарат выписан только для Вас. **Не делитесь этим препаратом с другими лицами и возвращайте неиспользуемые капсулы в аптеку.**

Карта напоминания для пациента

ФИО врача:

.....
.....
.....
.....

Телефон:

.....
.....

Примечания:

.....
.....